vinetur

Las heladas golpean los viñedos de Michigan y frenan la brotación

MSU alerta de daños de hasta 90% en yemas y de un repunte del riesgo de enfermedades tempranas

jueves 7 de mayo de 2026

Los viñedos de Michigan arrancan la campaña con un seguimiento estrecho de las heladas de abril y principios de mayo, según el informe semanal de Michigan State University Extension publicado este lunes. La entidad señala que el frío ha frenado el desarrollo de la vid en el norte del estado y ha causado daños en distintas zonas del sur, donde algunas parcelas han perdido parte de los brotes primarios.

En el suroeste de Michigan, la helada del 7 de abril dejó daños en yemas que van del 0% al 90%, según la ubicación. Una segunda helada, registrada el 2 de mayo con temperaturas en los 20°F, volvió a afectar a varias fincas. En algunas zonas bajas se ha observado una pérdida superior al 75% de los brotes primarios, mientras que otras parcelas no han sufrido daños. En las áreas afectadas por el episodio de abril ya han empezado a crecer brotes secundarios.

En el sureste del estado, las uvas para zumo avanzan hacia la elongación de brote en las zonas más cálidas cercanas a la frontera con Ohio, mientras que en las más frías están en apertura de yema. Las variedades híbridas para vino en la zona de Romeo se mueven entre hinchado completo y apertura de yema. En el norte, tanto las variedades viníferas como las híbridas siguen en reposo o muy cerca del hinchado de yema, con un avance más lento por las temperaturas bajas.

El informe sitúa la acumulación térmica actual en 327,4 grados día base 50°F en el suroeste de Michigan, frente a 97,8 en el noroeste y 97,9 en la región de Tip of the Mitt. La previsión apunta a un avance moderado en los próximos días, aunque el frío reciente puede retrasar la brotación respecto a lo habitual.

MSU Extension avisa también de que el riesgo de enfermedades tempranas va al alza en el sur del estado. Entre las principales preocupaciones figuran phomopsis, black rot, antracnosis, mildiu y oídio. La entidad recuerda que varias de estas infecciones necesitan lluvia para activarse y que basta una precipitación de 0,1 pulgadas por encima de 50°F para que pueda producirse una infección por black rot.

En materia de manejo, la recomendación pasa por mantener programas preventivos antes de floración y ajustar la fertilización al análisis del suelo y a los estudios foliares del año anterior. En las zonas del sur donde la vid ya ha iniciado el crecimiento del brote, pueden empezar aplicaciones fraccionadas de nitrógeno. En el norte conviene esperar a que arranque la actividad vegetativa antes de aplicar ese nutriente.

La extensión universitaria señala además que el aclareo de brotes debería comenzar dentro de una o dos semanas en los viñedos del sur, según la parcela y la variedad. En paralelo, insiste en vigilar plagas como grape berry moth, flea beetle y grape erineum mite. Los primeros machos de grape berry moth ya han sido capturados en viñedos del suroeste, aunque todavía no se considera necesario intervenir porque no hay hembras ni racimos disponibles para la puesta.

El informe incluye también avisos sobre jornadas técnicas previstas para este verano en Michigan y sobre la apertura próxima del registro para la Michigan Viticulture Field Day and Enology Experience y para la Dirt to Glass Conference, dos citas centradas en manejo del viñedo, elaboración y evaluación sensorial del vino.