vinetur

California extiende la alerta por el insecto invasor que amenaza sus viñedos

Las autoridades rastrean miles de plantas tras localizarlo en 22 condados vinculados a zonas vitivinícolas

martes 18 de agosto de 2026



California ha detectado el insecto invasor glassy-winged sharpshooter, conocido por transmitir la enfermedad de Pierce, en un número cada vez mayor de condados vinculados a zonas vitivinícolas del estado. Las autoridades agrarias no lo han localizado por ahora en viñedos comerciales, pero han ampliado las inspecciones y el trampeo por el riesgo que supone para una industria que ya atraviesa un periodo de menor demanda.

La enfermedad de Pierce es una infección bacteriana sin cura que daña la capacidad de la vid para absorber agua. La Universidad de California recuerda que la oleada más grave registrada en el norte del estado, a mediados de los años noventa, estuvo asociada al glassy-winged sharpshooter y arrasó más de 1.000 acres de viñedo, con pérdidas de 30 millones de dólares. En 2015 hubo otro episodio, de menor alcance, causado por el blue-green sharpshooter, un insecto emparentado con el anterior y propio de la zona.

El Departamento de Alimentación y Agricultura de California (CDFA, por sus siglas en inglés) informó a comienzos de este verano de la aparición de ejemplares de glassy-winged sharpshooter en vides vendidas en establecimientos de Costco del norte de California. Esas plantas procedían de un vivero de Fresno. La administración pidió a los compradores que aislaran las vides y contactaran con el estado para su destrucción.

En julio, el CDFA comunicó además la localización de glassy-winged sharpshooters y broad-headed sharpshooters en árboles desert willow vendidos en tiendas de Costco de 18 condados de California, entre ellos Santa Clara, San Diego y Los Ángeles. Ambas especies son invasoras. El glassy-winged sharpshooter es originario del sureste de Estados Unidos, mientras que el broad-headed sharpshooter procede de Centroamérica.

Joshua W. Bingham, de la oficina de asuntos públicos del CDFA, señaló que los desert willow tenían su origen en un vivero de Texas y añadió que la investigación sigue abierta. También precisó que los comisionados agrícolas de los condados están localizando e inspeccionando miles de vides y que el trampeo del glassy-winged sharpshooter continuará hasta finales de septiembre.

El pasado 4 de agosto, los servicios estatales identificaron un ejemplar de GWSS capturado en un vivero del condado de San Luis Obispo. Hasta ahora, las autoridades han encontrado este insecto en plantas de 22 condados, aunque calculan que pudo haber llegado a hasta 40 condados a través de plantas procedentes del vivero de Fresno.

El operativo de seguimiento incluye el contacto con más de 3.100 clientes que compraron esas vides y la colocación de más de 2.700 trampas adicionales, de acuerdo con el CDFA. La intención es localizar posibles focos antes de que el insecto pase de plantas ornamentales o de vivero a explotaciones vitícolas, donde la propagación de la bacteria tendría un impacto económico mayor.

El estado ha comprometido 820.000 dólares de financiación de emergencia para sufragar inspecciones y trampeo durante al menos tres años. Ese dinero procede de tasas pagadas por los productores de uva. Al mismo tiempo, los senadores federales por California Alex Padilla y Adam Schiff solicitaron 32 millones de dólares en fondos de emergencia al Departamento de Agricultura de Estados Unidos para tareas de rastreo y captura de estos insectos, pero la petición fue rechazada.

La preocupación de las autoridades se explica por el antecedente de los años noventa y por la capacidad de estos vectores para desplazarse con material vegetal comercializado a gran escala. El hecho de que los hallazgos se hayan producido en plantas vendidas al por menor y distribuidas en muchos condados obliga a revisar miles de ejemplares y a mantener la vigilancia durante semanas, con la vista puesta en evitar que la enfermedad de Pierce vuelva a causar daños amplios en el viñedo californiano.