vinetur

Una aplicación digital facilita el seguimiento de enfermedades del tronco de la vid en los viñedos franceses

La herramienta actualiza datos regionales y varietales, mostrando tendencias en esca y eutipiosis para mejorar la gestión vitícola

lunes 1 de septiembre de 2025



Una nueva aplicación digital permite a los profesionales del sector vitivinícola francés consultar la evolución de las enfermedades del tronco de la vid, como la esca y la eutipiosis, en diferentes regiones y variedades. Esta herramienta, que acaba de actualizarse con los datos del ciclo 2024, recoge información sobre la incidencia de síntomas foliares en los principales territorios productores: Charentes, Bordelais/Bergeracois, Val de Loire, Champagne, Alsacia/Lorena, Jura y Saboya.

El Observatorio Nacional de las Enfermedades del Tronco de la Vid se creó en 2003 por iniciativa de los Servicios de Alimentación y Protección Vegetal. Aunque su actividad oficial terminó en 2009, varios socios técnicos y científicos han seguido recogiendo datos cada año. Gracias al proyecto Climesca, financiado por el Plan Nacional de Decaimiento del Viñedo (PNDV), estos registros se han unificado y ahora están disponibles para toda la profesión a través de la plataforma de Epidemiosupervisión en Salud Vegetal (ESV).

En el ciclo 2024 se han monitorizado 549 parcelas. La incidencia media nacional de esca se sitúa en el 2,75%, frente al 3,39% registrado en 2023 y al 3,12% calculado como media desde 2003. Sin embargo, los expertos advierten que no se puede hablar de una reducción generalizada. Según Chloé Delmas, directora de investigación en INRAE, durante la última década la incidencia ha superado más veces la media que lo contrario. La enfermedad muestra oscilaciones anuales: aumenta en años húmedos como 2017 y 2021 y disminuye en años secos como 2003, 2015, 2019 y 2022.

En cuanto a la eutipiosis, los datos muestran una tendencia descendente más clara. En 2024 su incidencia ha sido del 0,42%, frente al 0,79% del año anterior. Es el valor más bajo registrado hasta ahora. Delmas explica que el cambio climático podría estar afectando negativamente al hongo responsable, que prefiere condiciones húmedas. Además, señala que las prácticas recomendadas a los viticultores desde que la enfermedad tuvo un repunte en los años 2000 —como las técnicas de poda y la recogida de restos vegetales— han dado resultados positivos.

La aplicación permite consultar y descargar gráficos con las incidencias por región y variedad. Esta información facilita el seguimiento anual para técnicos y productores interesados en conocer el estado sanitario del viñedo francés y adaptar sus estrategias de manejo según las tendencias observadas.