vinetur

# Le Burgenland ordonne l’arrachage des ceps infectés après la fin de la fenêtre de traitement insecticide

Les autorités ont délimité 77 zones d’infestation tandis que la flavescence dorée se propage dans certaines des régions viticoles les plus connues d’Autriche.

vendredi 14 août 2026



Les viticulteurs du Burgenland sont appelés à arracher les vignes infectées, la principale période d’utilisation efficace des insecticides étant désormais passée, alors que les autorités autrichiennes tentent de ralentir la propagation de la flavescence

dorée, une grave maladie de la vigne transmise par la cicadelle américaine de la vigne.

Le gouvernement régional du Burgenland a indiqué que l'insecte qui propage la maladie avance rapidement dans la région viticole d'Autriche orientale. Les autorités étaient déjà intervenues contre ce ravageur en mai au moyen d'une réglementation visant à en limiter la propagation. Mais en août, la cicadelle a atteint son stade adulte, et les traitements insecticides ne sont plus jugés utiles au cours de la saison de végétation en cours, car les produits phytosanitaires n'agissent que durant le stade larvaire de l'insecte.

Ce changement a fait entrer la riposte dans une nouvelle phase, centrée sur l'identification et l'arrachage des ceps malades. Les autorités ont indiqué que c'est le moment où les symptômes sont particulièrement visibles, ce qui permet aux viticulteurs et aux habitants qui ont des vignes de repérer plus facilement d'éventuelles infections dans les vignobles et les parcelles privées.

Selon le Land, les cépages blancs présentent généralement un jaunissement des feuilles, tandis que les cépages rouges développent une coloration rouge foncé. À mesure que la maladie progresse, les feuilles s'enroulent vers le bas. L'infection peut gravement endommager les ceps et les rendre improductifs.

« Nous pouvons encore lutter efficacement contre la maladie », a déclaré la vice-gouverneure Anja Haider-Wallner dans un communiqué publié par le Land. Elle a exhorté les viticulteurs et le public à inspecter les vignes avec soin et à éliminer rapidement, sous leur propre responsabilité, les plants infectés. « Chaque vigne arrachée enlève une partie de la base de la propagation ultérieure de la flavescence dorée », a-t-elle déclaré.

Le service officiel de protection des végétaux du Land a défini cette saison 77 zones d'infestation dans le Burgenland à partir d'échantillons de feuilles. Le seul district sans cas confirmé à ce jour est Mattersburg, même si 39 échantillons y attendaient encore d'être analysés par l'Agence autrichienne pour la santé et la sécurité alimentaire, connue sous le nom d'AGES.

La propagation a touché certaines des régions viticoles les plus connues du Burgenland. Les autorités ont indiqué que la région viticole d'Eisenberg, dans les districts de Güssing et d'Oberwart, la zone du Blaufränkischland autour de Deutschkreutz, Horitschon, Lutzmannsburg et Neckenmarkt, la région viticole du Leithaberg de Müllendorf à Jois, ainsi que la rive occidentale du lac de Neusiedl autour de Rust, ont été presque entièrement désignées comme zones de sécurité.

Dans la zone du Seewinkel, les communes viticoles de Gols, Podersdorf et Pamhagen figurent parmi les plus touchées. Ces désignations reflètent les zones où les autorités estiment qu'un suivi et des mesures de contrôle plus stricts sont nécessaires, à mesure que la pression de la maladie augmente.

La campagne compte bien au-delà d'une seule vendange. Le Burgenland est l'une des principales régions viticoles d'Autriche, connue pour ses vins rouges comme blancs, et la propagation d'une maladie de la vigne susceptible de détruire la productivité suscite des inquiétudes dans tout le secteur. Le message actuel du Land est qu'une fois qu'il n'est plus possible de cibler efficacement l'insecte par pulvérisation, le moyen le plus rapide de réduire le risque consiste à retirer les plantes hôtes infectées avant que la maladie ne puisse se propager davantage dans les vignobles et les plantations de vignes environnantes.